

CORNELL SCALE FOR DEPRESSION IN DEMENTIA

(ned. Vertaling: R.M. Dröes, Vakgroep Psychiatrie, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1993)

Scoringssysteem

a = niet te beoordelen 0 = afwezig 1 = licht of wisselend aanwezig 2 = ernstig

De beoordelingen zijn gebaseerd op symptomen en kenmerken zoals waargenomen in de week voorafgaande aan het interview. Er dient geen score te worden gegeven wanneer symptomen het resultaat zijn van lichamelijke beperkingen of ziekte.

De schalen worden gescoord door een hulpverlener met informatie die verkregen is uit een interview met de patiënt en een observant (verpleegkundige of partner/familieid). Een cut-off waarde van >8 duidt op lichte depressiviteit en >12 op matige/ernstige depressiviteit.

A. Stemminggerelateerde kenmerken

1. Angst angstige gezichtsuitdrukking, peinzend, zorgelijk	a	0	1	2
2. Verdrietig verdrietige gezichtsuitdrukking, verdrietige stem, huilerig	a	0	1	2
3. Reageert niet op plezierige gebeurtenissen	a	0	1	2
4. Prikkelbaarheid gauw kwaad, slecht gehumeurd	a	0	1	2

B. Gedragsstoornissen

5. Agitatie rusteloos, handenwringen, haarplukken	a	0	1	2
6. Vertraging trage bewegingen, langzame spraak, trage reacties	a	0	1	2
7. Meervoudige lichamelijke klachten (scoor 0 indien GI symptomen)	a	0	1	2
8. Interesseverlies t.a.v. gebruikelijke activiteiten (scoor alleen indien er een plotselinge verandering is opgetreden, d.w.z. binnen een periode van 1 maand)	a	0	1	2

C. Lichamelijke kenmerken

9. Vermindering van eetlust eet minder dan gewoonlijk	a	0	1	2
10. Gewichtsverlies (scoor 2 indien meer dan 2 kilo in 1 maand)	a	0	1	2
11. Gebrek aan energie gauw moe, niet in staat activiteiten vol te houden (scoor alleen indien er een plotselinge verandering is opgetreden, d.w.z. binnen een periode van 1 maand)	a	0	1	2

D. Cyclische functies

12. Dagelijkse stemmingsschommelingen 's morgens meer symptomen	a	0	1	2
13. Moeite met inslapen later dan gewoonlijk voor deze persoon	a	0	1	2
14. Wordt 's morgens meerdere malen wakker	a	0	1	2
15. Wordt 's morgens vroeg wakker vroeger dan gewoonlijk voor deze persoon	a	0	1	2

E. Stoornissen in de gedachteninhoud

16. Suicide gedachten vindt het leven niet de moeite waard, heeft doodswensen of doet een poging tot zelfmoord	a	0	1	2
17. Lage zelfwaardering zelfverwijten, minacht zichzelf, gevoel te falen	a	0	1	2
18. Pessimisme verwacht het ergste	a	0	1	2
19. Wanen die overeenstemmen met de stemming wanen m.b.t. armoede, ziekte, verlies	a	0	1	2