

Decubitusbehandelschema

Decubitusbehandelschema	Graad 1	Graad 2	Graad 3	Graad 4
Wondbeoordelingsaspecten	Lokale roodheid en/of cyanose die bij palpatie niet-wegdrukbaar is.	Huidletsel met blaarvorming en/of ontvelling, zonder ondermijning van onderliggende weefsel.	Huidletsel van opperhuid en lederhuid (ondiepe decubitus).	Huidletsel van opperhuid en lederhuid, waarbij bot, pees of kapsel kan zijn aangedaan (diepe decubitus).
	Geen extra huidmaatregelen, wel starten of intensiveren preventieve maatregelen.	Hak; blaardak intact: Blaar in laten drogen door vrijleggen hiel, evt. gebruik badstof sok.	Bij de wondbehandeling van graad 3 en 4 gelden dezelfde uitgangspunten. Zodoende kan voor de behandeling van graad 4 bij de behandelwijze van graad 3 worden gekeken.	
I. Droog wondoppervlak met:				
Necrose (zwart)			Hak met necrose: Hiel ontlasten met hielwig en necrose alleen dan verwijderen wanneer necrose loslaat Stuit met necrose: Necrotectomie en 3x dgs eusol-paraffine gazen of met zilver geïmpregneerde verbanden.	Zie graad 3.
Fibrinebeslag (geel)			Hak en stuitwond met fibrinebeslag: 1x dgs hydrogel onder folie.	Zie graad 3.
Granulatie (rood)		Stuit en hiel; ontvelling: 1x dgs Zinkolie FNA rondom wondranden en afdekken met vetgaas en folie of eilandpleister of Hydrocolloid aanbrengen indien het minimaal 3 dgn blijft zitten.	Stuit en hiel; ontvelling: 1x dgs Zinkolie FNA rondom wondranden en afdekken met vetgaas en folie of eilandpleister of Hydrocolloid aanbrengen indien het minimaal 3 dgn blijft zitten.	Stuit en hiel; ontvelling: 1x dgs Zinkolie FNA rondom wondranden en afdekken met vetgaas en folie of eilandpleister of Hydrocolloid aanbrengen indien het minimaal 3 dgn blijft zitten.
II. Matig wondvocht met:				
Necrose (zwart)			Hak met nattende necrose: Necrotectomie en 3x dgs hypochloriet-oplossing of met zilver geïmpregneerde verbanden aanbrengen Stuit met nattende necrose: 3x dgs Eusol-paraffine of met zilver geïmpregneerde verbanden.	Zie graad 3.
Fibrine beslag (geel)			Hak of stuit met matig wondvocht: 1x dgs alginaat of vezelverband en evt. combinatie met schuimverband.	Zie graad 3.
Granulatie (rood)		Hak; ontvelling: 1x per 2 dgn schuimverband Stuit; ontvelling: 1x dgs Zinkolie FNA rondom wondranden en afdekken met vetgaas en folie of eilandpleister of Hydrocolloid aanbrengen indien het minimaal 3 dgn blijft zitten.	Hak; ontvelling: 1x per 2 dgn schuimverband Stuit; ontvelling: 1x dgs Zinkolie FNA rondom wondranden en afdekken met vetgaas en folie of eilandpleister of Hydrocolloid aanbrengen indien het minimaal 3 dgn blijft zitten.	Zie graad 2.
III. Veel wondvocht met:				
Necrose (zwart)			Hak en stuit: necrotomie en hypochloriet oplossing.	
Fibrinebeslag (geel)			Hiel en stuit; 1x dgs vezelverband, schuimverband of alginaat in combinatie met schuimverband.	Zie graad 3.
Granulatie (rood)		Hak: vetgaas met schuimverband of folie.	Hak; ontvelling: 1x per 2 dagen schuimverband Stuit; ontvelling: 1x dgs Zinkolie FNA rondom wondranden en afdekken met vetgaas en folie of eilandpleister of Hydrocolloid aanbrengen indien het minimaal 3 dgn blijft zitten.	Zie graad 2.